



СПИД

Возбудитель: ВИЧ
(вирус иммунодефицита человека).

Симптомы:

- ВИЧ поражает клетки иммунной системы;
- выявить ВИЧ можно только через 3-6 месяцев после заражения по выработанным за этот период антителам;
- пока ВИЧ-инфекция не перешла в стадию СПИДа (этот период может длиться более 12 лет), человек может выглядеть и чувствовать себя здоровым и продолжать заражать других;
- стадия СПИДа длится не более 3 лет;
- полностью излечиться от ВИЧ пока невозможно, вакцины от ВИЧ пока нет.



Что делать, чтобы не заболеть?

- пользоваться презервативом при любом сексуальном контакте;
- иметь постоянного полового партнера;
- не употреблять наркотики;
- вести здоровый образ жизни.

По поводу ИППП следует обращаться к врачам следующих специальностей:

- дерматовенеролог;
- гинеколог (для женщин);
- уролог (для мужчин).

Не лечитесь самостоятельно!

О факте ИППП сообщите партнеру!

**До окончания лечения
воздержитесь от секса!**

Помните, что все ИППП, кроме ВИЧ, практически излечимы, если лечение начато своевременно!



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БУЗ УР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ МЗ УР»

Немного о том, что должен знать каждый



**ИНФЕКЦИИ,
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
(ИППП)**

Для многих секс – часть длительных прочных отношений, но некоторые имеют сексуальные контакты без устойчивых взаимоотношений с партнером. Чтобы помочь обезопасить Вашу сексуальную жизнь, поговорим о профилактике инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).

Что такое ИППП?

ИППП – ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПРИ ЛЮБОМ ВИДЕ ПОЛОВОГО КОНТАКТА. РЯД ИЗ НИХ (ГЕПАТИТЫ, ВИЧ И СИФИЛИС) ПЕРЕДАЮТСЯ ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ КРОВЬ. ИППП – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ И СЕКСУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ.



ГОНОРЕЯ

Возбудитель: гонококк.

Симптомы:

- желтовато-зеленоватые выделения из половых органов;
- отек, боль и жжение при мочеиспускании;
- боли в животе и половых органах;
- может поражать глаза, рот, глотку.

СИФИЛИС

Возбудитель: бледная трепонема.

Симптомы:

- 1 стадия:** безболезненные язвочки на месте внедрения трепонемы; увеличение лимфоузлов;
- 2 стадия:** периодическая сыпь, лихорадка, усталость, боль в суставах;
- 3 стадия:** поражение костей, суставов, головного и спинного мозга.

ГЕРПЕС

Возбудитель: вирус герпеса.

Симптомы:

- зуд;
- жжение;
- покраснение;
- боли при мочеиспускании;
- появление маленьких пузырьков, которые вскрываются, и на их месте образуются язвочки;
- симптомы могут исчезнуть и появиться вновь;
- вirus в организме остается на всю жизнь.

КОНДИЛОМАТОЗ

Возбудитель: вирус папилломы.

Симптомы:

- появление на слизистой оболочке половых органов и заднего прохода светло-розовых разрастаний в виде бородавок, которые вызывают зуд, жжение;
- боль при мочеиспускании и половом контакте.

ГЕПАТИТ В и С

Возбудитель: вирус гепатита.

Симптомы:

- пожелтение кожи, белков глаз, языка;
- потемнение мочи;
- обесцвечивание кала до цвета белой глины;
- боли в правом подреберье;
- снижение аппетита, усталость;
- если не лечить, приводит к циррозу печени.

ХЛАМИДИОЗ

Возбудитель: хламидия.

Симптомы:

- проходит бессимптомно у 60 % женщин и 30 % мужчин;
- редко боли при мочеиспускании;
- боли внизу живота через месяц после заражения;
- может поражать глаза;
- приводит к бесплодию.