

Анкета по выявлению подозрения на злокачественные новообразования

Ф.И.О. _____ Дата рождения _____

Адрес _____ телефон _____

злокачественные новообразования ротовой полости

Показатель	Баллы
Затруднение глотания, боль при глотании	5
Припухлость, утолщение языка длительное время	7
Затруднение жевания, глотания, движения челюстью, языком	7
Онемение языка	7

злокачественные новообразования молочной железы

Показатель	Баллы
Операции на молочной железе, травмы молочной железы в анамнезе	6
Бесплодие, отсутствие родов, длительная лактация (более 2-х лет)	3
Изменение формы молочной железы, выделения из соска	6

злокачественные новообразования дыхательной системы

Показатель	Баллы
Курение	5
Длительный кашель, изменение характера кашля у курильщика	5
Кровохарканье	10
Слабость, одышка	5
Хронический ларингит, фарингит	5
Охриплость, изменение тембра голоса 2 недели и более	7
Непроходимая боль в ухе	3
Потеря веса	3

злокачественные новообразования мочеполовой системы

Показатель	Баллы
Ночное мочеиспускание, неполное опорожнение мочевого пузыря, вялая струя мочи, мочеиспускание малыми порциями	3
Возраст старше 40 лет	2
Боли при мочеиспускании, неприятные ощущения	2
Кровь в моче	5
злокачественные новообразования кожи	
Показатель	Баллы
Длительное или частое пребывание на солнце	2
Большое количество родинок (более 50) или большой их размер	2
Увеличение, уплотнение, кровоточивость родимого пятна	5
появление зуда, покалывания в области родинки	2

Злокачественные новообразования кишечника (колоректальный рак)

Показатель	Баллы
I группа	
Возраст от 45 лет для мужчин и старше 50 лет для женщин	2
Наличие колоректального рака, рака желудочно-кишечного тракта у кровных родственников	3
Полипы толстого кишечника, образования, разрастания в области ануса в анамнезе	3
Кровь в кале, положительная реакция на скрытую кровь	3
II группа	
Анемия неясного генеза	5
Неустойчивый стул, ложные позывы к дефекации, чувство неполного опорожнения кишечника при дефекации, хронические запоры	5
Вздутие живота, анемия, схваткообразные ли длительно держащиеся боли в животе, в области таза	5
Потеря веса, отсутствие аппетита, отвращение к пище	5
Кровь в кале	4
Возраст 45 лет и старше	2

Рак желудка

Показатель	Баллы
I группа	
Возраст старше 50 лет	2
Наличие рака ЖКТ у кровных родственников	3
Положительная реакция на скрытую кровь	3
Язва желудка с локализацией на большой кривизне	5
Язвенная болезнь желудка, впервые выявленная в возрасте старше 45 лет	5
Состояние после резекции желудка (10 лет и более после операции)	3
Хронический диффузный атрофический гастрит с поражением не менее 2-х отделов желудка	3
Атрофически-гиперпластический гастрит	3
Болезнь Менентрие	5
В12дефицитная анемия	5
2 группа	
Анемия неясного генеза	5
Диспептические жалобы, впервые возникшие в возрасте старше 45 лет	5
Снижение аппетита, потеря веса, слабость, отвращение к пище, тяжесть после приема пищи	5
Длительно продолжающиеся боли в верхних отделах живота, локализованные в одном месте	3
Кровь в кале	4
Возраст 45 лет и старше	2

0-5 баллов-низкий риск

От 6-9 баллов-умеренный риск (необходимо обратиться в поликлинику для обследования)

Более 10 баллов-высокий риск (необходимо срочно обратиться в поликлинику для дообследования)

